

<p style="text-align: center;">Sengeenhet Intensiv / overvåkning</p> <p style="text-align: center;">Remdesivir GS-5734 (Gilead Sciences)</p>					
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrering	Holdbarhet RT=Romtemperatur K= Kjøleskap	Merknader
<p>100 mg Inf.subst.</p> <p>Hetteglass</p>	<p>Tilsett 19 ml sterilt vann til 100 mg tørrstoff.</p> <p>Konsentrasjon: 5 mg/ml</p> <p>Rist godt til alt er oppløst. Innholdet i hetteglasset tilsvarer da 100 mg Remdesivir.</p>	<p>Fortynningsvæske:</p> <p>NaCl 9 mg/ml</p> <p>IV infusjon:</p> <p>20 ml (100 mg) stamløsning fortynnes med 250 NaCl 9 mg/ml.</p>	<p>IV infusjon:</p> <p>Gis over 30 minutter.</p> <p>Ladningsdose på 200 mg gis som to 100 mg doser rette etter hverandre. Infusjonstid på 30 min gjelder fortsatt for begge dosene gitt.</p>	<p>Holdbarhet er inkludert brukstid!</p> <p>Ubrukt hetteglass: RT</p> <p>Stamløsning: 24 timer i K eller maks 4 timer i RT før fortynning</p> <p>Fortynnet løsning: 24 timer i K</p>	<p>OBS! Kan gi smerter på injeksjonsstedet.</p>